UWE HORNIG (Oppach) & JÖRG LORENZ (Löthain)

Neues aus der Käferfauna Sachsens (Coleoptera) – 6. Beitrag

Zusammenfassung Innerhalb der zwei Jahre 2016/2017 Jahres konnten 212 Statusänderungen für Sachsen zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ registriert werden. Anfang 2018 sind in Sachsen 4861 Arten bekannt, davon über 4000 mit Nachweisen seit dem Jahr 2000.

Summary **News from the beetle fauna of Saxony (Coleoptera) – 6th article. –** Within two years (2016/2017) the status of 212 species in the „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ changed. Now 4861 species are known in Saxony, more than 4000 of which were recorded since the year 2000.

1. Einleitung

Dem Verzeichnis der Käfer Deutschlands (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) folgten die beiden Nachträge KÖHLERS (2000, 2011). Nach SIEBER et al. (2011), KLAUSNITZER, HORNIG et al. (2012) und HORNIG et al. (2013, 2014, 2016) wird hier die in diesem Rahmen sechste zusammenfassende Übersicht zu Änderungen der sächsischen Käferfauna vorgelegt, die wie bisher ausnahmslos alle uns bekannt gewordenen Statusänderungen seit der vorhergehenden Publikation enthält. Insgesamt werden für die letzten beiden Jahre, abgesehen von denen aus VOGEL (2017), 132 Statusänderungen für Sachsen genannt, darüber hinaus für 15 Arten Hinweise, Klarstellungen bzw. Korrekturen. Die meisten sächsischen Neufunde wurden und werden bereits separat publiziert (HOFFMANN & GEBERT 2016, RÖßNER 2016, KWAST 2016, DIETRICH 2017a, b, GOLLKOWSKI 2017, KRAHL 2017, VOGEL 2017, PESCHEL 2017, 2018, HAUSOTTE & DÄBRITZ 2017, KLAUSNITZER et al. 2018, BERGER in Vorb.).

Bis Anfang 2016 konnten wir beim Hochladen aktueller Funde für Sachsen ins Verzeichnis der Käfer Deutschlands Online (DKat) ein gewisses Plateau erreichen: Ohne dass wir sie in den bisherigen fünf Beiträgen speziell nannten, hatten 87,8 % aller seit 1950 nachgewiesenen Arten bzw. 81,0 % aller sächsischen Käfer Belege ab dem Jahr 2000 (HORNIG et al. 2016). Somit erscheint es jetzt gerechtfertigt, die Arten mit erstmaligem Fund seit 2000 [Sn*(+)] auch explizit aufzuführen – es handelt sich durchaus um mitteilenswerte Funde. Zwischenzeitlich nahm bereits VOGEL (2017) diese Möglichkeit bei den Staphylinidae wahr; seine publizierten Statusänderungen werden hier summarisch angefügt. Bis zu dem von ihm gewählten Stichtag 31.12.2016 hatten wir bereits 961 von damals insgesamt 1164 sächsischen Staphyliniden-Arten ausschließlich online von + auf * hochgestuft, lediglich 131 Staphylinidae mit + waren verblieben (12 % der vormaligen +Arten dieser Familie). – Als „aktuell für Sachsen“ werden aber einstweilen und letztmalig nur die wiedergefundenen und bisher allein vor 1950 (–, •) belegten Arten bezeichnet.

Zur Symbolik siehe die Tabellenüberschrift. Die hier verwendete „sächsische“ Zählung stimmt nun nach dem Abgleich von taxonomischen Unstimmigkeiten mit dem Verzeichnis der Käfer Deutschlands Online (DKat 2017) exakt überein. MTD bezeichnet das Senckenberg Museum für Tierkunde Dresden, MNG das Senckenberg Naturkundemuseum Görlitz, NME das Naturkundemuseum Erfurt.

2. Statusänderungen im Bestand sächsischer Coleoptera seit März 2016

Carabidae

Calosoma investigator (ILLIGER, 1798): **Sn–(?):** Altenberg, Geisingberg, 1941, det. MÜLLER-MOTZFELD. **Neu (aber verschollen) für Sachsen!**

Philorhizus melanocephalus DEJEAN, 1825: **Sn*(–):** Tagebau Espenhain, aus Moos gesiebt, 16.02.2016, Quelle: Kerbtier.de (2017), Fotobestimmung [t. GEBERT]. Damit aktuell für Sachsen.

Trechus amplicollis FAIRMAIRE, 1859: **Sn?:** eine Meldung aus dem Elbsandsteingebirge, für die anscheinend kein Beleg existiert (DKat 2018: LOMPE in litt. 2014).

Haliplidae

Haliplus fulvicollis ERICHSON, 1837: **Sn*(+):** Tschernske bei Niesky, Petutschteich, 09.09.2017, 7 Ex., leg., coll. et det. GEBERT.

Haliplus varius NICOLAI, 1822: **Sn*(–):** Bad Muskau, Neißeaue, 2011, 1 Ex., leg. T. BERGER, det. HENDRICH, coll. Zoologische Staatssammlung München. Aktuell für Sachsen in BERGER (in Vorbereitung).

Dytiscidae

Colymbetes paykulli ERICHSON, 1837: **Sn*(+):** Sagar, Neißeaue, 04.2004, 1 Ex., leg. T. BERGER, det. KÜTTNER, vid. JÄGER.

Hydroporus elongatulus STURM, 1835: **Sn–(*):** Nochten, 2014, leg. APENBORN (KLAUSNITZER 2016); die Art und der Beleg sind in der Artenliste in LAMMERS & APENBORN (2017) explizit verzeichnet, aber im Text als fehldeterminiert (*H. umbrosus*) korrigiert!

Hygrotus confluens (FABRICIUS, 1787): **Sn*(+):** Niederoderwitz, Kiesgrube, 22.05.2016, 6 Ex., leg., coll. et det. RICHTER.

Nebrioporus canaliculatus (LACORDAIRE, 1835): **Sn*(+):** Niederoderwitz, Kiesgrube, 22.05.2016, 2 Ex., leg., coll. et det. RICHTER.

Gyrinidae

Gyrinus suffriani W. SCRIBA, 1855: **Sn*(+):** Delitzsch, Neuhauser See, 11.05.2016, 2 ♂, leg. BERNHARD (BERNHARD 2016).

Hydrophilidae

Hydrobius fuscipes (LINNAEUS, 1758): **Sn*(*):** Wurde in drei Arten aufgespalten: *H. rottenbergii* GERHARDT, 1872, *H. fuscipes* und *H. subrotundus* STEPHENS, 1829 (FOSSEN et al. 2016; vergleiche FREUDE-HARDE-LOHSE, Band 3, dort als Formen bzw. ssp.). Revidierte Belege in KLAUSNITZER et al. (2018).

Hydrobius rottenbergii GERHARDT, 1872: **Sn*:** Leippe, Lichtfang, 08.08.1992, 1 ♂, leg. E. KWAST; Schleife-Mulkwitz, Innenkippe Nochten, Siebkescher, 27.05.2015, 1 ♀, leg. GEBERT & HOFFMANN; Großpostwitz, Pheromonfalle, 05.2013, 1 ♂, leg. RIEDEL; Seitenhain bei Liebstadt, Bodenfalle, 12.05.2004, 1 ♂, leg. GEBERT, alle coll. et det. HOFFMANN. Großschönau, 21.04.1968, 1 ♀, 09.09.1973, 1 ♂; Zittau, 14.08.1999, 1 Ex., alle leg. et coll. SIEBER, det. HOFFMANN. Weitere Belege in KLAUSNITZER et al. (2018). Siehe *H. fuscipes*.

Hydrobius subrotundus STEPHENS, 1829: **Sn+:** Ebersbach/Sa., 02.05.1986, 26.06.1987, je 1 Ex., beide leg., coll. et det. HORNIG. Siehe *H. fuscipes*.

Histeridae

Acritus minutus (HERBST, 1791): **Sn*(+):** Torgau, Gehölz auf Elbwiesen, 05.08.2015, leg., coll. et det. LORENZ.

Saprinus virescens (PAYKULL, 1798): **Sn*(+):** Rödgen (Zscheppelin), Acker, 05.2012, 2 Ex., leg. ZSCHERNITZ, coll. et det. HOFFMANN.

Agyrtidae

Agyrtes bicolor CASTELNAU, 1840: **Sn*(+):** Löthain bei Meißen, Garten, Bodenfalle, 09.11.2014, leg., coll. et det. LORENZ.

Leptinidae

Platypsyllus castoris RITSEMA, 1869: **Sn*(+):** Krauschwitz (Neiße), an Biber-Totfund, 25.02.2016, 3 Ex., coll. MNG. Zweitfund für Sachsen und neu für die Oberlausitz in KLAUSNITZER et al. (2018).

Cholevidae

Choleva nivalis (KRAATZ, 1856): **Sn*(+):** Kühnheide, Motthäuser Heide, Moor, Bodenfalle, 28.08.2008, 1 Ex., leg., coll. et det. WEIGEL.

Leiodidae

Leiodes cinnamomea (PANZER, 1793): **Sn?(*):** Alle revidierten Oberlausitzer Belege sind *L. oblonga* zuzuordnen, ebenso die aus coll. LORENZ (alle det. rev. BURGARTH). Nach gegenwärtigem Stand kann dies auf alle sächsischen Nachweise zutreffen. *L. cinnamomea* lebt an Trüffeln. **Für Sachsen vorerst fraglich.**

Leiodes dubia (FABRICIUS, 1793): **Sn*(+):** Plauen, mehrfach 2007/2009, leg. WEIGEL, BURGER, coll. MTD, WEIGEL, det. BURGARTH. Kühnheide, Motthäuser Heide, Moor, 28.07.2008, leg. WEIGEL, coll. MTD, det. SVEC.

Scydmaenidae

siehe Staphylinidae

Ptiliidae

Ptenidium turgidum C. G. THOMSON, 1855: **Sn*:** Wendishain, Straupenbachtal, 10.07.2014, 3 Ex., leg. et det. WEIGEL, coll. Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn [Barcoding-Projekt]. **Neu für Sachsen!**

Ptinella johnsoni RUTANEN, 1985: **Sn*:** Ostritz, Neißetal, 23.06.2016, 3 ♀, leg. SIEBER, coll. SIEBER (2), HOFFMANN (1), det. HOFFMANN. Neu für Deutschland in HOFFMANN & GEBERT (2016).

Staphylinidae

Aleochara peusi WAGNER, 1949: **Sno(+):** synonym zu *Aleochara cuniculorum* KRAATZ, 1858 (DKat 2017).

Cephennium carnicum REITTER, 1882: im DKat Ende 2016 wegen Fehlbestimmung einer ganzen Serie gestrichen [**Sn/(*)**], fast gleichzeitig aber tatsächlich gefunden worden, siehe die folgende Übersicht zu VOGEL (2017).

Euplectus brunneus (GRIMMER, 1841): **Sn***: Rabenau, 01.09.2016, 3 Ex., leg. et coll. PESCHEL, det. VOGEL. Neu für Sachsen in PESCHEL (2018).

Euplectus sparsus BESUCHET, 1964: **Sn***: Brunndöbra bei Klingenthal, NSG Goldberg, 17.07.2007, 1 Ex., leg. WEIGEL, coll. APFEL, det. BRACHAT. **Neu für Sachsen!**

Eusphalerum luteum (MARSHAM, 1802): **Sn*(+):** Westsachsen mehrfach (Oelsnitz/Vogtland, Ruppertsgrün, Steinbach/Erzgeb., Zwönitz/Erzgeb.), 2001-2005, leg. WEIGEL, BURGER, det. APFEL. Großhennersdorf (Oberlausitz), 16.07.2014, 2 Ex., leg., coll. et det. LORENZ, vid. VOGEL. Weitere Funde seit 2000 in VOGEL (2017).

Metopsia clypeata (P. MÜLLER, 1821): **Sn/:** Der bei JÄGER et al. (2016) publizierte Nachweis meint *M. similis* ZERCHE 1998 [= *clypeata* auct., sensu FREUDE-HARDE-LOHSE Band 4, KÖHLER & KLAUSNITZER 1998]. *M. clypeata* kommt in Sachsen nicht vor.

Mycetoporus bosnicus LUZE, 1901: **Sn*(+):** Seifhennersdorf, Burgsberg, Blockhalde, 16.03.2015, leg. SIEBER, det. VOGEL, vid. SCHÜLKE.

Neuraphes carinatoides REITTER, 1909 [= *N. carinatus* auct., sensu KÖHLER & KLAUSNITZER 1998]: **Sn*(*):** Nomenklatur entsprechend LÖBL & LÖBL (2015, mit Kommentar von H. MEYBOHM auf S. 22), die in Deutschland in allen Regionen verbreitete Art (DKat 2018).

Neuraphes carinatus (MULSANT & REY, 1861) [= *N. imitator* W. BLATTNÝ & C. BLATTNÝ, 1919]: **Sn–(–):** Für Sachsen bleibt, entgegen der Interpretation in VOGEL (2017), weiterhin (und nur) HORION zu berücksichtigen: „Sachsen: Umg. Leipzig, t. MACHULKA". In Deutschland nur aus fünf Regionen gemeldet (Dkat 2018).

Neuraphes praeteritus (E. C. RYE, 1872): **Sn*:** Leisnig/Mulde, Eichberg, stehende tote Buche, 23.05.2012, 1 Ex., leg. WEIGEL, coll. et det. APFEL. **Neu für Sachsen!**

Ocypus fulvipennis ERICHSON 1840: **Sn*(+):** Plauen, Großer Weidenteich, 08.10.2007, 5 Ex., leg. WEIGEL, det. APFEL.

Quedius truncicola FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1856: **Sn*(+):** Dresden, Park Schloss Albrechtsberg, 13.08.2013, leg. et det. LORENZ, vid. et coll. VOGEL.

Weitere 80 Statusänderungen für Staphylinidae (einschl. Scydmaenidae) wurden von VOGEL (2017) veröffentlicht:

Sn*: *Eusphalerum atrum* (HEER), *Euplectus kirbii* DENNY, *Bibloplectus spinosus* RAFFR., *Cousya nigrata* (FAIRM. LAB.), *Phacophallus pallidipennis* (MOTSCH.)
Sn*(+): 30 Arten [siehe Einleitung oben]
Sn*(–): *Atheta testaceipes* (HEER), *Ilyobates propinquus* (AUBE), *Thiasophila inquilina* (MÄRK.), *Thinobius longipennis* (HEER), *Stenus pallipes* GRAV., *Paederus limnophilus* ER.
Sn*(?): *Mycetoporus brucki* (PAND.), *Hydrosmecta linkei* (BENICK)
Sn*(/): *Cephennium carnicum* RTT. [siehe oben], *Ontholestes haroldi* (EPPH.)

Sn+: *Quedius mesomelinus skoraszewskyi* KORGE
Sn+(*): *Claviger longicornis* MÜLL., *Phloeopora nitidiventris* FAUV.
Sn+(–): *Bledius atricapillus* (GERM.)
Sn+(?): *Atheta clientula* (ER.), *Zoosetha inconspicua* (ER.)

Sn–: *Philonthus confinis* STRAND
Sn–(*): *Philonthus ebeninus* (GRAV.)
Sn–(+): *Brachygluta haematica* (REICHB.), *Tachyusa balteata* ER., *Stenus guttula* MÜLL., *Stenus longipes* HEER, *Stenus sylvester* ER.
Sn–(?): *Apimela mulsanti* (GANGLB.), *Meotica marchica* BENICK

Sn•(–): *Scydmoraphes sparshalli* (DENNY)
Sn•(?): *Eusphalerum anale* (ER.)

Sn?: *Hydrosmecta tenuissima* (EPPH.) [oder eher korrigierte Falschmeldung?], *Meotica exillima* SHP., *Gabrius suffragani* JOY
Sn?(+): *Aleochara diversa* (SAHLB.) [=*A. kamila*], *Gyrophaena poweri* CROTCH, *Dinarda hagensii* WASM., *Neuraphes ruthenus* MACH.
Sn?(–): *Sepedophilus bipustulatus* (GRAV.), *Oxypoda miranda* ROUB., *Stenus incanus* ER., *Eutheia schaumi* KIESW., *Euconnus wetterhallii* (GYLL.), *Neobisnius prolixus* (ER.)
Sn?(•): *Stenus exspectatus* PUTHZ

Sn/: *Aleochara milleri* KR., *Gyrophaena nitidula* (GYLL.)
Sn/(•): *Brachygluta hemoptera* (AUBE)
Sn/(?): *Aloconota ultima* (BENICK & LOHSE)

Cantharidae

Malthinus fasciatus (A. G. OLIVIER, 1790): **Sn?(*):** westeuropäische Art, bis Sachsen-Anhalt und Tschechien (*M. moravicus* ist dagegen vor allem im Osten verbreitet), totale Konfusion bei bisherigen Meldungen, Überprüfungen notwendig, in Thüringen bisher alles *M. moravicus* (KOPETZ in litt.).

Malthinus moravicus ŠVIHLA, 1997 [= *fasciatus* auct., nec A. G. OLIVIER, 1790]: **Sn*:** Neu für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2009).

Malthodes debilis KIESENWETTER, 1852: **Sn*(+):** Wörblitz, OT Greudnitz, Elbufer, 20.06.2015, ♂♂, leg. LORENZ, coll. et det. LORENZ & KOPETZ. Hohenprießnitz, Mulde-Ufer, Lichtfang, 25.06.2016, 1 ♂, leg., coll. et det. LORENZ.

Malthodes flavoguttatus KIESENWETTER, 1852: **Sn*(+):** Holzhau (Osterzgebirge), Wiesenaue der Freiberger Mulde südöstlich Teichhaus, 14.07.2017, 1 ♂, leg. coll. et det. LORENZ.

Malachiidaae

Malachius rubidus ERICHSON, 1840: **Sn*(–):** Plauen, Großer Weidenteich, Eklektor an Kiefer, 02.06.2008, 2 Ex., leg. BURGER, det. KOPETZ. **Aktuell für Sachsen!**

Malachius scutellaris ERICHSON, 1840: **Sn*(+):** Zschepplin, Muldeaue, Altarm Schenkwerder, 06.05.2014, leg., coll. et det. LORENZ.

Dasytidae

Trichoceble floralis (A. G. OLIVIER, 1790): **Sn*(+):** Kossa, Authausener Wald, 05.09.2016, 1 Ex., leg. et det. WEIGEL.

Trogossitidae

Tenebroides fuscus (GOEZE, 1777): **Sn*(+):** Dresden-Nord, Zucht aus starken Aststücken einer abgestorbenen Amerikanischen Weiß-Eiche, abgesägt 09.2016, ins Zuchtgefäß gelegt 03.2017, geschlüpft im Sommer 2017, 2 Ex., leg., coll. et det. LORENZ.

Elateridae

Agriotes brevis CANDEZE, 1863: **Sn*(–):** Dahlener Heide, Ochsensaal, geklopft, 26.04.2014, 1 Ex., leg. et coll. PESCHEL, det. HOLZER. Laut DKat (2017) bisher nur vor 1950 in Bayern und Sachsen. Aktuell für Deutschland in PESCHEL (2017).

Agriotes medvedevi DOLIN, 1960: **Sn/(*):** Der Meldung in HORNIG et al. (2016) lag nach erneuter Überprüfung durch H. MÜLLER sehr wahrscheinlich eine Fundortverwechslung mit einem Beleg aus Ungarn, Puszta Hortobágy, Mai 2001, coll. H. MÜLLER, zugrunde. Für Sachsen zu streichen (KLAUSNITZER et al. 2018).

Hypnoidus consobrinus (MULSANT & GUILLEBEAU, 1855): **Sn–(•):** Zeithorizont zu korrigieren (KLAUSNITZER et al. 2009).

Buprestidae

Agrilus delphinensis ABEILLE DE PERRIN, 1897: **Sn*:** Döhlen bei Torgau, auf Salix aurita, 04.06.2015, 1 ♂, leg., coll. et det. KWAST. Neu für Sachsen in KWAST (2016).

Buprestis splendens FABRICIUS, 1775: **Sn•(•):** Ein Ex. aus dem Elbsandsteingebirge (vergleiche KEITEL 1998), ex coll. HÄNEL, MTD, Ankauf 1914, stammt laut KWAST (in litt.) wohl aus dem Zeitraum vor 1900, weitere Belege aus Sachsen sind KWAST nicht bekannt.

Dryopidae

Dryops anglicanus EDWARDS, 1909: **Sn*:** Lodenau, Niederspree, Großer Tiefzug, 09.08.2010, 1 Ex., leg. GEBERT, coll. HOFFMANN, det. HOFFMANN, HORNIG, JÄGER. Neu für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2018).

Dryops griseus (ERICHSON, 1847): **Sn*(+):** Oderwitz, Königsholz, 31.01.2013, 2 Ex. (cf.), leg. et coll. RICHTER, det. HOFFMANN.

Dermestidae

Dermestes erichsoni GANGLBAUER, 1904: **Sn*(•):** Niederoderwitz, Lichtfang, 19.07.2017, 1 Ex., leg., coll. et det. RICHTER, vid. HOFFMANN, HORNIG. Aktuell für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2018). Der Nachweis ist evtl. in Zusammenhang mit der Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners zu sehen, in dessen Nestern sich die Larve entwickelt.

Byrrhidae

Byrrhus glabratus HEER, 1841: **Sn*(+):** Cunewalde, Ortslage, 19.05.2017, 1 Ex., leg., coll. et det. LORENZ, vid. JÄGER.

Nitidulidae

Meligethes atramentarius FÖRSTER, 1849: **Sn*(+):** Hirschfelde, 30.04.2017, 1 ♂, leg. et coll. SIEBER, det. HOFFMANN.

Monotomidae

Monotoma quadricollis AUBÈ, 1837: **Sn*:** Chemnitz, Rottluff, aus Kompost gesiebt, 12.10.2008, 1 Ex., leg. et coll. PESCHEL, det. WEIGEL. Neu für Sachsen in PESCHEL (2017).

Rhizophagus oblongicollis BLATCH & HORNER, 1892: **Sn*:** Zittau, A.03.1997, 1 Ex., leg. et coll. SIEBER, det. ESSER. Waltersdorf, 10.-14.05.2015, 2 Ex.; Neschwitz, 12.07.2015, 2 Ex., alle leg. et coll. HOFFMANN, det. ESSER. Neu für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2018).

Erotylidae

Triplax aenea (SCHALLER, 1783): **Sn*(+):** Annaberg-Buchholz, 620 m über NN, an Austern-Seitling, 26.04.2011 (DIETRICH 2013).

Triplax lepida (FALDERMANN, 1837): **Sn*:** Kossa, Authausener Wald, 30.07.2015, 1 Ex., leg. et det. WEIGEL, coll. Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Osnabrück. **Neu für Sachsen!**

Cryptophagidae

Atomaria abietina J. R. SAHLBERG, 1888: **Sn?(*):** Mit einem ♀ in KLAUSNITZER et al. (2009) als fraglich geführt, dann zwischenzeitlich zur Sachsenfauna gerechnet. Bis zur Bestätigung mit ♂♂ aber weiterhin fraglich. In Deutschland nur in Südbayern nachgewiesen (DKat 2018).

Atomaria morio KOLENATI, 1846: **Sn*(*):** Die Funde bei PESCHEL (2018) sind die einzigen uns bekannten seit dem Jahre 2000. Die Art kommt nicht in der Oberlausitz vor.

Atomaria nitidula (MARSHAM, 1802): **Sn?(*):** Mit einem ♀ (cf.) in KLAUSNITZER et al. (2009) als fraglich geführt, dann zwischenzeitlich zur Sachsenfauna gerechnet. Bis zur Bestätigung mit ♂♂ aber weiterhin fraglich.

Atomaria subangulata J. R. SAHLBERG, 1926: **Sn*:** Carlsfeld (Eibenstock, Erzgebirge), Großer Kranichsee, Eklektor am Waldrand, 23.07.2004, 1 Ex., leg. BURGER, coll. WEIGEL, det. ESSER. **Neu für Sachsen!** Nachbarart von *A. abietina* (siehe oben); in Deutschland nur in Südbayern und Baden nachgewiesen (DKat 2018).

Atomaria zetterstedti (ZETTERSTEDT, 1838): **Sn*:** Quolsdorf, in Nagernest, 14.06.2015, 1 Ex., leg. STRIESE, coll. MNG, det. ESSER. Neu für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2018).

Latridiidae

Latridius consimilis MANNERHEIM, 1844: **Sn*:** Löbau, unter Ahornrinde, 27.02.2016, 1 Ex., leg. et coll. RICHTER, det. RÜCKER. Neu für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2018).

Endomychidae

Dapsa denticollis (GERMAR, 1817): **Sn*(+):** Nossen, ehemaliger Steinbruch im Muldental, 28.08.2014, leg. KÜHNE & REIKE, coll. et det. REIKE, 16.09.2014, leg., coll. et det. LORENZ, 29.04.2015, leg., coll. et det. REIKE.

Coccinellidae

Oenopia impustulata (LINNAEUS, 1767): **Sn*(+):** Zittau, Weinaupark, 01.02.2000, leg. et coll. SIEBER.

Oenopia lyncea (A. G. OLIVIER, 1808): **Sn*(+):** Leipzig, Bienitz, 03.05.2017, auch 2016 und 03.05.1920, je 1 Ex. (HAUSOTTE & DÄBRITZ 2017).

Mycetophagidae

Mycetophagus salicis C. N. F. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1862: **Sn*(o):** Die Synonymisierung (LÖBL & SMETANA 2008) mit *M. piceus* (FABRICIUS, 1777) bleibt umstritten. Die Arten sind ökologisch und nach dem Bau des männlichen Genitals (LOMPE 2016) gut zu trennen und werden im Einklang mit dem Verzeichnis der Käfer Deutschlands (DKat 2017) wieder als zwei Arten geführt, vergleiche KLAUSNITZER et al. (2009).

Zopheridae, Colydiinae

Synchita mediolanensis A. VILLA & J. B. VILLA, 1833: **Sn*(/):** NSG Seußlitzgrund, Lichtfang, 31.7.2017, 1 Ex., leg., coll. et det. LORENZ. Dresden-Nord, Zucht aus starken Aststücken einer abgestorbenen Amerikanischen Weiß-Eiche, abgesägt 09.2016, ins Zuchtgefäß gelegt 03.2017, geschlüpft im Sommer 2017, 1 Ex., leg., coll. et det. LORENZ, vid. ESSER. **Neu für Sachsen!** ESSER (DKat) vermutet 2016 eine Häufigkeitszunahme der Art.

Ciidae

Ennearthron pruinosulum (PERRIS, 1864): **Sn:*** Hoyerswerda, auf Totholz, 09.08.2016, 2 Ex., leg. et coll. HOFFMANN, det. REIBNITZ. Neu für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2018).

Sulcacis bidentulus (ROSENHAUER, 1847): **Sn*:** Königswartha, Vorwerkteich westlich Caminau, Lufteklektor an Hybridpappel, 06.-07.2016, 4 Ex., leg. KÄSTNER & GUTZEIT, coll. LORENZ, det. REIBNITZ. Hoyerswerda, Stadtgebiet, 09.08.2016, 1 Ex., leg. et coll. HOFFMANN, det. REIBNITZ. Diesbar-Seußlitz, NSG Seußlitzgrund, 06. 2017, Lufteklektor an Hybridpappel, 1 Ex., leg. JÄGER & LORENZ, coll. LORENZ, det. REIBNITZ. Neu für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2018).

Oedemeridae

Nacerdes carniolica (GISTEL, 1834): **Sn*:** Leipzig-Burghausen, am Bienitz beim Leuchten, 21.07.2017, Quelle: Kerbtier.de (2017), Fotobestimmung [t. HORNIG]. Damit neu für Sachsen.

Oedemera flavipes (FABRICIUS, 1792): **Sn*(+):** Plauen, Großer Weidenteich, 26.05.2008, 2 Ex., 28.07.2008, 1 Ex., leg. BURGER, coll. et det. WEIGEL.

Anthicidae

Hirticollis hispidus (ROSSI, 1792): **Sn*(+):** Köllitzsch, Brache, 26.06.2014; Nieschütz, Elbufer, 20.07.2014, beide leg., coll. et det. LORENZ.

Notoxus cf. *brachycerus* (FALDERMANN, 1837): **Sn*(•):** Niederoderwitz, 18.07.2012, 1 Ex., leg. et coll. RICHTER, det. HOFFMANN. Aktuell für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2018).

Mordellidae

Mordellistena austriaca SCHILSKY, 1898: **Sn*(+):** Plauen, Großer Weidenteich, 08.09.2007, 1 Ex., leg. WEIGEL, coll. NME, det. HORÁK.

Mordellistena dieckmanni ERMISCH, 1963: **Sn*(–):** Niederoderwitz, 08.06.2016; Hainewalde, Kiesgrube, 19.08.2016, je 1 Ex., beide leg. et coll. RICHTER, det. FUCHS. Aktuell für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2018).

Mordellistena koelleri ERMISCH, 1956: **Sn*(–):** Hainewalde, Kiesgrube, 30.05.2015, 1 Ex., leg. et coll. SIEBER, det. FUCHS. Aktuell für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2018).

Mordellistena pseudopumila ERMISCH, 1963: **Sn*:** Hainewalde, Kiesgrube, 30.05.2015, 2 Ex., leg. et coll. SIEBER, det. FUCHS. Neu für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2018).

Mordellistena secreta HORÁK, 1983: **Sn***: Hoyerswerda-Seidewinkel, 30.04.2014, 1 ♂; Hoyerswerda-Zeißig, 07.07.2014, 1 ♀, beide leg. et coll. HOFFMANN, det. FUCHS. Bertsdorf, Breiteberg, 29.05.2016; Hainewalde, Kiesgrube, 06.06.2016, je 1 Ex., beide leg. et coll. SIEBER, det. FUCHS. Neu für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2018).

Mordellistena tarsata MULSANT, 1856: **Sn*:** Hainewalde, Kiesgrube, 30.05.2015, 2 Ex., leg. et coll. SIEBER, det. FUCHS. Neu für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2018).

Variimorda briantea (COMOLLI, 1837): **Sn*:** Niederoderwitz, 18.08.2016; Hainewalde, Kiesgrube, 19.08.2016, je 1 Ex., beide leg. et coll. RICHTER, det. FUCHS. Neu für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2018).

Melandryidae

Orchesia fusiformis SOLSKY, 1871 [= *acicularis* REITTER, 1886]: **Sn*(+):** GOLLKOWSKI (2008).

Osphya bipunctata (FABRICIUS, 1775): **Sn*(•):** Kossa, Authausener Wald, 07.06.2016, 1 Ex., leg. et det. WEIGEL, coll. Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Osnabrück. **Aktuell für Sachsen!**

Tenebrionidae

Diaclina testudinea (PILLER & MITTERPACHER, 1783): **Sn+(+):** Von PESCHEL (in litt.) seit 1987 nie wieder gefunden; die Ebereschen, einschließlich der abgestorbenen, wurden ein Jahr darauf gefällt (vergl. HORNIG 1998 mit den Originalzitaten dieses singulären Fundes in Braunsdorf bei Flöha).

Mesomorphus villiger BLANCHARD (1853): **Sni:** Der „tobacco ground beetle“ wurde auch nach Leipzig importiert (HORION 1956).

Lyctidae

Lyctus cavicollis LECONTE, 1866: **Sn*(*):** Niederoderwitz, Lichtfang, 11.07.2016, 1 Ex., leg., coll. et det. RICHTER. Zweitfund der invasiven Art für Sachsen, siehe HORNIG et al. (2016) und KLAUSNITZER et al. (2018).

Trogoxylon impressum (COMOLLI, 1837): **Snv:** Löthain bei Meißen, im Garten schwärmend, 14.6.2017, 1 Ex., leg., coll. et det. LORENZ. Wahrscheinlich Verschleppung mit alten Rebstöcken aus der Pfalz oder Apfelholz aus Baden-Württemberg (beides im Garten vorhanden).

Anobiidae

Dorcatoma androgyna BÜCHE 2001: **Sn*(?):** Diesbar-Seußlitz, NSG Seußlitzgrund, Lufteklektor an absterbender Linde, 1 ♂, 06.2017, leg., coll. et det. LORENZ. Dresden, Dresdner Heide, Malaisefalle neben toter Buche, 1 ♂, 22.-28.06.2017, leg. KALLWEIT, NILSEN & REIMANN, coll. et det. LORENZ. **Neu für Sachsen!** Bisher nur ein (lokal unsicherer) Beleg aus Dresden-Blasewitz, ex coll. STAUDINGER, det. BÜCHE, siehe KLAUSNITZER et al. (2009).

Ernobius abietinus (GYLLENHAL, 1808): **Sn*(+):** Plauen, Großer Weidenteich, 26.04.2008, 1 Ex., leg. BURGER, det. WEIGEL.

Xyletinus laticollis (DUFTSCHMID, 1825): **Sn*:** Hainewalde, Kiesgrube, 03.07.2016, 1 Ex., leg. et coll. RICHTER, det. RICHTER, BÜCHE, 08.06.2017, 1 Ex., leg., coll. et det. SIEBER. Neu für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2018).

Xyletinus vaederoeensis LUNDBLAD, 1969: **Sn*(*):** Kleinraschütz bei Großenhain, Lufteklektor an Kiefer in lichtem Kiefern-Zitterpappel-Birken-Mischwald, 05.2011, 1 ♂; Blatterslebener Grund, Lufteklektor an Zitterpappel, 06.2016, 2 ♂ (zusammen mit *X. fibyensis*), 07.2016, 1 ♂, 1 ♀; Diesbar-Seußlitz, NSG Seußlitzgrund, Lufteklektor an Hybridpappel; 05.2017, 4 ♂ (zusammen mit *X. fibyensis*), 06. 2017, 6 ♂, alle leg., coll. et det. LORENZ.

Ptinidae

Ptinus clavipes (PANZER, 1805): **Sn*(o):** Diploide Form; in LÖBL & SMETANA (2007) unter *P. latro* FABRICIUS, 1775 (der triploiden parthenogenetischen Form) synonymisiert. Im Einklang mit dem Verzeichnis der Käfer Deutschlands (DKat 2017) werden diese Formen – wie anderweitig auch Unterarten – getrennt geführt. Aktuelle Nachweise z. B. in KLAUSNITZER et al. (2009).

Scarabaeidae

Aphodius porcus (FABRICIUS, 1792): **Sn*(+):** nordöstlich Hoyerswerda (MTB 4451), in Pferdedung, 30.09.2015, in Anzahl, leg., coll. (7 Ex.) et det. LIEBSCHER (LIEBSCHER 2016).

Melinopterus reyi (REITTER, 1892) [*Aphodius*]: **Sn•:** Saxonia, coll. SEIDLITZ, Zoologische Staatssammlung München. Neu (aber verschollen) für Sachsen in RÖßNER (2016).

Cerambycidae

Acmaeops marginatus (FABRICIUS, 1781): **Sn*(+):** Weißwasser-Süd, Fuchsberge, Binnendüne, 26.05.2013, 1 Ex., leg. LIEBIG, coll. et det. HOFFMANN.

Agapanthia violacea (FABRICIUS, 1775) **Sn/(/):** gemeldet in LORENZ & BRUNK (2017). In Deutschland kommt statt dieser Art *A. intermedia* GANGLBAUER, 1884 vor.

Isotomus speciosus (D. H. SCHNEIDER, 1787): **Sn•(•):** einziger Fund: Meißen, aus Kornelkirsche, um 1900, wohl importiert (KLAUSNITZER & STEGNER, in Vorbereitung). Wird im Vergleich mit den Einstufungen in anderen DKat-Regionen einstweilen belassen.

Leiopus punctulatus (PAYKULL, 1800): **Sn+(•):** Lichtenhain, Kirnitzschtal, 1978; Moritzburg, 1979, beide leg. ZINKE (KLAUSNITZER & STEGNER, in Vorbereitung).

Mesosa curculionoides (LINNAEUS, 1760): **Sn–(–):** kein aktueller Nachweis, Datenbankeinträge falsch.

Monochamus sutor (LINNAEUS, 1758): **Sn*(+):** Schönfeld, 2003, leg. WEIGEL. Langenau, 2013, leg. SCHIWORA (KLAUSNITZER & STEGNER, in Vorbereitung).

Monochamus urussovii (FISCHER VON WALDHEIM, 1805): **Sni:** Neuwürschnitz, 1981 (ZEUNER 1994 zitiert von KLAUSNITZER & STEGNER, in Vorbereitung).

Oberea pupillata (GYLLENHAL, 1817): **Sn*(–):** Dresden, 2013-2017 regelmäßig, leg. GUTZEIT (GUTZEIT in litt.). **Aktuell für Sachsen!**

Phytoecia pustulata (SCHRANK, 1776): **Sn*(+):** Reichwalde, an Achillea, 03.06.2017, 2 Ex. in Kopula, leg., coll. et det. KRAHL.

Pronocera angusta (KRIECHBAUMER, 1844): **Sn–(+):** letzter Nachweis: Dresdener Heide, 1949 (KLAUSNITZER & STEGNER, in Vorbereitung).

Ropalopus varini (BEDEL, 1870): **Sn*(–):** bei Eilenburg, LSG Kämmereiforst, 2003, leg. NEUMANN (KLAUSNITZER & STEGNER, in Vorbereitung).

Stictoleptura fulva (DEGEER, 1775) [*Paracorymbia*]: **Sn+(–):** Wiesa bei Görlitz, 1971, leg. SANDER. Aktuell für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2009).

Trichoferus campestris (FALDERMANN, 1835): **Sn*:** Görlitz, Südstadt, 05.08.2015, 1 ♀, leg. et coll. KRAHL, det. ADLBAUER, WEIGEL. 2006 erstmals in Mähren, 2009 in Polen nachgewiesen, möglicherweise eine Neubesiedlung von (Süd-)Osten her. Als Erstfund für Sachsen in KRAHL (2017). Vorher nach Deutschland nur ein Import in die Pfalz (07.2013, Lichtfalle, 1 Ex., coll. WEIGEL), möglicherweise mit auf dem Rhein verschifftem Holz (WEIGEL in litt.); außerdem unpublizierte Hinweise auf Importe nach Bayern und Norddeutschland.

Chrysomelidae

Cassida seladonia GYLLENHAL, 1827: **Sn*(*):** Mehrere Fehlbestimmungen gemeldet, t. FRITZLAR (WEIGEL in litt.). Für die Oberlausitz existiert aber ein aktueller Fund, det., FRITZLAR (KLAUSNITZER et al. 2009).

Chaetocnema arida FOUDRAS, 1860: **Sn*(+):** Plauen, Großer Weidenteich, 2007, mehrfach, leg. WEIGEL, coll. FRITZLAR, MTD, det. FRITZLAR.

Coptocephala rubicunda (LAICHARTING, 1781): **Sn*(+):** südlich Bad Brambach (Vogtland), Hohendorf, 10.09.2016, 1 Ex., leg. WALTER, coll. et det. LORENZ.

Cryptocephalus ocellatus DRAPIEZ, 1819: **Sn*(+):** Hoyerswerda-Kühnicht, Gartenanlage, Kräuterbeet, 09.07.2012, 1 Ex., leg. et coll. HOFFMANN, det. FRITZLAR. Großtreben, ehemalige Kiesgrube Prudel Döhlen, 18.06.2015, leg., coll. et det. LORENZ.

Cryptocephalus pygmeus pygmaeus FABRICIUS, 1792: **Sn*(+):** Blatterslebener Grund angrenzend an NSG Seußlitzgrund, Trockenhang, 05.07.2015, leg., coll. et det. LORENZ.

Dibolia timida (ILLIGER, 1803): **Sn*(+):** Großtreben, ehemalige Kiesgrube Prudel Döhlen, 18.06.2015, leg., coll. et det. LORENZ.

Longitarsus noricus LEONARDI, 1976: **Sn*:** Hainewalde, Kiesgrube, 14.06.2015, 1 Ex., leg. et coll. SIEBER, det. FRITZLAR. Neu für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2018).

Longitarsus reichei (ALLARD, 1860): **Sn*:** Wurbis, Kiesgrube, 30.07.2015, 1 Ex., leg. et coll. SIEBER, det. FRITZLAR. Neu für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2018).

Luperomorpha xanthodera (FAIRMAIRE, 1888): **Sn*:** Dresden, Dresdner Heide, Malaisefalle neben toter Buche, 1 ♂, 22.-28.06.2017, leg. KALLWEIT, NILSEN & REIMANN, coll. LORENZ, det. FRITZLAR. Der „Asiatische Rosenblattkäfer", aus Ostasien stammend, wurde in Europa erstmals 2003 in England nachgewiesen. Im DKat (2018) bereits für die Regionen Bayern-Nord, Württemberg, Baden, Pfalz, Hessen, Westfalen, Hannover, Weser-Ems und Brandenburg gemeldet. Wahrscheinlich mit Pflanzenballen eingeschleppt, in Gärtnereien zu finden (Entomologie Stuttgart 2016). **Neu für Sachsen!**

Oreina alpestris (SCHUMMEL, 1843): **Sn–(–):** Von HORION (1951) wird ssp. *polymorpha* KRAATZ für Sachsen mit den Literaturquellen UHMANN (Erzgebirge) und ERMISCH-LANGER (Vogtland) zitiert. CHRYFAUN listet Belege (ohne Angabe der Unterart) von 1957 aus dem Erzgebirge, coll. Museum für Naturkunde Braunschweig, was noch nicht überprüft wurde. Laut KIPPENBERG kommt die östlichere Unterart *alpestris* bis ins Riesengebirge vor, die westlichere ssp. *polymorpha* im Thüringer Wald, der Rhön und dem Harz; dazwischen kennt KIPPENBERG (in litt.) keine sächsischen Belege. In Verbindung mit der nicht zweifelsfrei geklärten ssp.-Zugehörigkeit (wobei deren Verwechslung viel unwahrscheinlicher ist als zum Beispiel eine solche mit *O. speciosissima*) sollte der Status der Art in Sachsen anhand von überprüften Belegen abgesichert werden. Für die Beibehaltung des Status spräche auch LANGE (1886), der *O. alpestris polymorpha* vom Haßberg nennt, welcher in Tschechien unweit der Grenze und der Hochfläche beim deutschen Ort Satzung liegt (DIETRICH in litt.).

Oreina cacaliae senecionis (SCHUMMEL, 1843): **Sn*(+):** Erzgebirge, Kammregion bei Tellerhäuser, A.07.2016, zahlreiche Imagines und Larven an Senecio hercynicus (DIETRICH in litt.).

Phyllotreta punctulata (MARSHAM, 1802): **Sn*(+):** Piskowitz bei Meißen, Trockenhang, 05.2002, leg. et coll. LORENZ, det. DÖBERL.

Phyllotreta scheuchi HEIKERTINGER, 1941: **Sn***: Fremdiswalde (nördlich Wurzen), Bodenfalle auf Ackerbrache, 06.2015, 1 Ex., leg., coll. et det. LORENZ, vid. FRITZLAR. **Neu für Sachsen!**

Plateumaris braccata (SCOPOLI, 1772): **Sn*(+):** Commerau bei Königswartha, 05.2017, 3 Ex., leg. et det. GEBERT, coll. HOFFMANN.

Plateumaris rustica (KUNZE, 1818): **Sn*(+):** Geyer, NSG Hermannsdorfer Wiesen, 20.06.2006, 1 Ex., leg. GEBERT, coll. et det. HOFFMANN.

Psylliodes thlaspis FOUDRAS, 1860: **Sn*(+):** Plauen, Großer Weidenteich, 08.09.2007, 1 Ex., leg. WEIGEL, coll. MTD, det. FRITZLAR.

Bruchidae

Bruchidius seminarius (LINNAEUS, 1767): **Sn*:** Löthain bei Meißen, Lichtfang, 29.5.2017, 3 Ex., leg., coll. et det. LORENZ. **Neu für Sachsen!**

Scolytidae

Ips duplicatus (C. R. SAHLBERG, 1836): **Sn*(*):** Pirna, Elbufer nähe FND Pratzschwitzer Elblachen, Lichtfang, 15.6.2017, 1 Ex., leg., coll. et det. LORENZ, vid. REIKE. Zweitfund in Sachsen (siehe HORNIG et al. 2016).

Apionidae

Omphalapion dispar (GERMAR, 1817): **Sn*(+):** Nimtitz, Kiesgrube, 14.05.2015; Liebersee, Kiesgrube, 18.06.2015, leg., beide coll. et det. LORENZ.

Omphalapion laevigatum (PAYKULL, 1792): **Sn*(+):** Gürth/Vogtland, 30.07.2013, 1 Ex., leg. et coll. WEIGEL, det. APFEL.

Exapion corniculatum (GERMAR, 1817): **Sn+(–):** Kreischa, aufgelassener Steinbruch Blauberg, Ruderalflur mit Ginster, Streifsackfang, 14.05.1992, 1 Ex. (gemeinsam mit *Exapion difficile*), leg., coll. et det. LORENZ.

Nanophyidae

Nanophyes brevis BOHEMAN, 1845: **Sn*:** Reichwalde, zusammen mit *N. marmoratus* an Lythrum salicaria, 08.2017, insgesamt 9 Ex., leg. KRAHL, det. BEHNE. Neu für Sachsen in KLAUSNITZER et al. (2018).

Curculionidae

Ceutorhynchus leprieuri C. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1881: **Sn*(+):** NSG Rotstein, 30.04.2016, 1 ♀, leg. et coll. MÜLLER, det. BEHNE.

Ceutorhynchus pervicax WEISE, 1883: **Sn*(+):** Zittauer Gebirge, Waltersdorf, 11.05.2016, 1 ♂, leg. et coll. SIEBER, det. BEHNE.

Cycloderes pilosulus (HERBST, 1795): **Sn*:** Blattersleben bei Meißen, südexponierter Wiesenhang, 21.04.2016, 1 Ex., leg., coll. et det. LORENZ; 20.05.2016, 1 Ex., leg. JÄGER. **Neu für Sachsen!**

Donus elegans (BOHEMAN, 1842): **Sn?:** Bei REITTER, Band 5, p. 99 unter *Hypera*: „Ich besitze ein von ROSENHAUER in Sachsen gefundenes Stück, ein 2. von Heidelberg.“ Obwohl EDMUND REITTER für uns eine Autorität ist, erscheint die Quelle v. a. wegen des Fundortes Heidelberg zweifelhaft. Nach FREUDE-HARDE-LOHSE Band 11 bis in die Sudeten und den Böhmerwald verbreitet, aber SKUHROVEC (in litt.) kennt (abgesehen von Pyrenäen und Alpen) nur Belege aus Ungarn, Rumänien und Polen, Angaben für die Slowakei basieren auf Fehldetermination.

Dorytomus hirtipennis BEDEL, 1884: **Sn*(+):** Daubitz, 17.07.2015, 1 ♂, leg. et coll. SIEBER, det. BEHNE. Zittau, 11.06./17.06.2015, 3 ♂, 2 ♀, leg. MÜLLER, coll. MÜLLER, DEI Müncheberg, det. BEHNE.

Glocianus distinctus (C. N. F. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1870): **Sn*(+):** Hainewalde, 01.07.2016, 1 ♀, leg. et coll. MÜLLER, det. BEHNE.

Hypera ononidis (CHEVROLAT, 1863): **Sn*:** Plauen, Großer Weidenteich, 19.06.2007, 05.07.2007, je 1 Ex., leg. et det. WEIGEL, coll. NME. **Neu für Sachsen!**

Liparus glabrirostris (KÜSTER, 1849): **Sn*(+):** Fichtelberg, Schönjungferngrund, ca. 1030 m über NN, 13.06.2009; nahe Zusammenfluss Große / Kleine Mittweida, ca. 560 m über NN, 16.06.2014 (DIETRICH 2014).

Orthochaetes setiger (L. BECK, 1817): **Sn*(+):** Plauen, Großer Weidenteich, 08.10.2007, 1 Ex., leg. et det. WEIGEL, coll. NME.

Otiorhynchus armadillo (ROSSI, 1792): **Sn*:** Zwönitz, 2016, leg. MEHLHORN. Neu für Sachsen in GOLLKOWSKI (2017).

Otiorhynchus fullo (SCHRANK, 1781): **Sn*(+):** Nimtitz, Kiesgrube, 14.05.2015, leg., coll. et det. LORENZ.

Pissodes piceae (ILLIGER, 1807): **Sn–(–):** Eine aktuelle Meldung (Kleinraschützer Heide bei Großenhain, JÄGER et al. 2016) bezieht sich auf *P. castanaeus* (DEGEER, 1775), coll. LORENZ, det. BEHNE.

Polydrusus pilosus GREDLER, 1866: **Sn*(+):** Carlsfeld (Westerzgebirge), nähe Neues Wiesenhaus, 10.05.2017, 1 Ex., leg., coll. et det. LORENZ.

Rhinusa linariae (PANZER, 1792): **Sn*(+):** Kreba-Neudorf, Schwarze Lache, 24.10.2015, 1 ♀, leg. et coll. KRAHL, det. BEHNE. Seifhennersdorf, 06.05.2016, 1 ♂, leg. et coll. SIEBER, det. BEHNE.

Rutidosoma graminosus GISTEL, 1857 [*globulus* (HERBST, 1795)]: **Sn*(+):** Hainewalde, Kiesgrube, 06.06.2016, 1 Ex., 26.06.2016, 2 Ex., 07.07.2016, 18.07.2016, je 1 Ex., alle leg., coll. et det. SIEBER.

Sibinia tibialis GYLLENHAL, 1835: **Sn/:** Die Meldung in JÄGER et al. (2016) ist unzutreffend.

Sirocalodes quercicola (PAYKULL, 1792): **Sn*(+):** Wartha bei Groß Särchen, 06.05.2016, 1 ♂, leg. et coll. MÜLLER, det. BEHNE.

Strophosoma sus STEPHENS, 1831: **Sn*(+):** Kleinraschützer Heide bei Großenhain (JÄGER et al. 2016), 06.2010, Barberfalle, 1 Ex., leg. JÄGER, coll. MTD.

Tychius crassirostris KIRSCH, 1871: **Sn*:** Frohnau, 05.06.2016, 1 Galle; im Bestand von Melilotus albus bei weiteren Begehungen zahlreiche Gallen (DIETRICH in litt.). Neu für Sachsen in DIETRICH (2017a, b), mit Abbildung der Galle.

3. Zusammenfassende Übersicht

Tabelle 1 fasst im Anschluss an die Vorpublikation von 2016 alle 212 Statusänderungen dieses Beitrages zusammen. Das sind (bei 55 aus verschiedenen Gründen gänzlich neu hinzugekommenen Arten) insgesamt 369 Zu- und Abgänge bei den einzelnen Symbolen, die aus Gründen der Nachvollziehbarkeit in den entsprechenden Spalten der Tabelle 1 nicht saldiert wurden.

Von den insgesamt 57 neuen Arten für Sachsen sind 13 (*Calosoma investigator* [verschollen], *Ptenidium turgidum*, *Euplectus sparsus Neuraphes praeteritus*, *Triplax lepida, Atomaria subangulata*, *Synchita mediolanensis, Dorcatoma androgyna, Luperomorpha xanthodera, Phyllotreta scheuchi, Bruchidius seminarius, Cycloderes pilosulus* und *Hypera ononidis*) bisher noch nicht publiziert bzw. veröffentlicht worden. Der summarische Artenzuwachs von 38 Arten in Tabelle 1 resultiert aus dem gleichzeitigen Wegfall von 19 Arten (überwiegend Staphylinidae).

Der Artenbestand hat sich in Sachsen Anfang 2018 auf 4861 Käferarten (einschließlich Unterarten) erhöht. Davon sind jetzt 83,3 % seit dem Jahr 2000 belegt (gegenüber 81,0 % Anfang 2016).

Tab. 1: Artenzahlen der Coleoptera in Sachsen, Stand 02.02.2018. Symbolik: * jüngste Belege ab dem Jahr 2000, + 1950-1999, – 1900-1949, • vor 1900, v/i verschleppt/importiert, ? fraglich, / Falschmeldungen, o synonymisierte oder seit 1998 anderweitig entfallene Taxa.

Jahr	***,+**		–	•	**Summe**	**v/i**	**?**	**/**	**o**	**gesamt**
A2016[g]	4451		229	143	**4823**	37	76	71	18	**5025**
	* 3907	+ 544								
Änd. seit 03/2016[h]	+154 –10	+10 –101	+13 –24	+3 –7	**+38**	+3	+20 –10	+8 –3	+1 –2	**+55**
aktuell	**4051**	**453**	**218**	**139**	**4861**	40	86	76	17	**5080**
Anteil	**83,3 %**	**9,3 %**	**4,5 %**	**2,9 %**	**100 %**					

Anmerkungen:
[g] Stand in HORNIG et al. (2016).
[h] alle Änderungen explizit in dieser Arbeit enthalten (Staphylinidae Sn*(+) part. in VOGEL 2017).

4. Dank

Für Funddaten, Determinationen und Hinweise danken wir KARL ADLBAUER, WOLFGANG APFEL, LUTZ BEHNE, Dr. CHRISTOPH BENISCH, TORSTEN BERGER, VOLKER BRACHAT, KAI BURGARTH, FRANK BURGER, WOLFGANG DIETRICH, MANFRED DÖBERL †, JENS ESSER, ROLF FRANKE, Dr. FRANK FRITZLAR, HERBERT FUCHS, JÖRG GEBERT, STEPHAN GÜRLICH, RONNY GUTZEIT, WERNER HOFFMANN, JAN HORÁK, OLAF JÄGER, UWE KALLWEIT, TOMMY KÄSTNER, Dr. HORST KIPPENBERG, PROF. DR. DR. BERNHARD KLAUSNITZER, ANDREAS KOPETZ, MICHAEL KRAHL, ANGELA KÜHNE, TOM KWAST, WOLF-HARALD LIEBIG, MIKE LIEBSCHER, HEIKO MÜLLER †, FRAUKE NIELSEN, RÜDIGER PESCHEL, JOHANNES REIBNITZ, Dr. HANS-PETER REIKE, Dr. ANDRÉ REIMANN, WOLFGANG RICHTER, ECKEHARD RÖßNER, Prof. Dr. MICHAEL SCHMITT, MAX SIEBER, Dr. JIŘÍ SKUHROVEC, DIETER STRIESE, ZDENĚK ŠVEC, JÜRGEN VOGEL, Dr. SABINE WALTER, ANDREAS WEIGEL, HERBERT WINKELMANN und CLARISSE ZSCHERNITZ.

Literatur

BERGER, T. (in Vorbereitung): [*Haliplus varius* aktuell für Sachsen].

BERNHARD, S. (2016): Aktuelle Nachweise von *Gyrinus distinctus* AUBÉ, 1836 und *Gyrinus suffriani* SCRIBA, 1855 in Sachsen (Coleoptera, Gyrinidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **60** (2): 150-151.

DIETRICH, W. (2013): Beobachtung einiger Käferarten an und in Pilzen (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte **57** (3): 158-162.

DIETRICH, W. (2014): Beobachtungen von *Liparus germanus* (LINNAEUS, 1758) und *Liparus glabrirostris* KÜSTER, 1849 im Mittleren Erzgebirge (Coleoptera: Curculionidae). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen **33 (**110): 154-157.

DIETRICH, W. (2017a): Funde einiger von Insekten und Milben verursachter Gallen: sechster Beitrag (Insecta, Acari). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen **36 (**119): 3-7.

DIETRICH, W. (2017b): Blattgallen des Dickrüsseligen Blütenrüsslers – *Tychius crassirostris* KIRSCH, 1871 im Erzgebirge gefunden (Coleoptera, Curculionidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **61** (1): 75-76.

DKat [KÖHLER, F., KLAUSNITZER, B., GÜRLICH, ST., BLEICH, O. und weitere Autoren (Landesbearbeiter)] (2017/2018): Verzeichnis der Käfer Deutschlands Online. – www.colkat.de.

Entomologie Stuttgart [REIBNITZ, J.] (2016): *Luperomorpha xanthodera* (FAIRMAIRE, 1888). In: Die Käfer-Fauna Südwestdeutschlands. – http://entomologie-stuttgart.de/ask [30.01.2018].

FOSSEN, E. I. F., EKREM, T., NILSSON, A. & BERGSTEN, J. (2016): Species delimitation in northern European water scavenger beetles of the genus *Hydrobius* (Coleoptera, Hydrophilidae). – ZooKeys **564**: 71-120.

GOLLKOWSKI, V. (2008): Interessante Käferfunde aus Sachsen (1972 bis 2007) (Coleoptera). **–** Entomologische Nachrichten und Berichte **52** (2): 143.

GOLLKOWSKI, V. (2017): Interessante Käferfunde aus Sachsen (10) (2016) (Coleoptera). **–** Entomologische Nachrichten und Berichte **61** (1): 71.

HAUSOTTE, M. & DÄBRITZ, A. (2017): Aktuelle Marienkäfernachweise (Coleoptera: Coccinellidae) auf dem Bienitz bei Leipzig. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen **36** (122): 117-122.

HOFFMANN, W. & GEBERT, J. (2016): *Ptinella johnsoni* RUTANEN, 1985 – Neu für Deutschland (Coleoptera, Ptiliidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **60** (3/4): 184.

HORION, A. (1951): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 2 Bände. – Alfred Kernen Verlag, Stuttgart, 536 S.

HORION, A. (1956): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band V: Heteromera. – Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey Tutzing bei München. Sonderband. – Tutzing bei München, 336 S.

HORNIG, U. (1998): Kommentiertes Verzeichnis der Schwarzkäfer (Coleoptera, Tenebrionidae) des Freistaates Sachsen. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen **39**: 12-16.

HORNIG, U., FRANKE, R., GEBERT, J., HOFFMANN, W., JÄGER, O., KLAUSNITZER, B., LORENZ, J., RICHTER, W. & SIEBER, M. (2013): Neues aus der Käferfauna Sachsens (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte **57** (3): 113-119.

HORNIG, U., LORENZ, J., HOFFMANN, W. & SIEBER, M. (2014): Aktualisierte Übersicht zur Käferfauna Sachsens (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte **58** (3/4): 155-160.

HORNIG, U., HOFFMANN, W., JÄGER, O., KLAUSNITZER, B., KWAST, T., LORENZ, J. & SIEBER, M. (2016): Ein neuer Zwischenstand bei der Bearbeitung der Käferfauna Sachsens (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte **60** (1): 19-27.

JÄGER, O., BRUNK, I., & LORENZ, J. (2016): Zur Insekten- und Spinnenfauna der Kleinraschützer Heide bei Großenhain in Sachsen – Allgemeiner Teil und Käfer (Coleoptera). – Sächsische Entomologische Zeitschrift **8** (2014/2015): 30-67.

KEITEL, M. (1998): Kommentiertes Verzeichnis der Prachtkäfer (Coleoptera, Buprestidae) des Freistaates Sachsen. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen **39**: 8-11.

Kerbtier.de [BEHNISCH, CH.] (2017). – www.kerbtier.de [12.12.2017].

KLAUSNITZER, B. (2016): Rote Liste und Artenliste Sachsens. Wasserbewohnende Käfer. – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 76 S.

KLAUSNITZER, B., BEHNE, L., FRANKE, R., GEBERT, J., HOFFMANN, W., HORNIG, U., JÄGER, O., RICHTER, W., SIEBER, M. & VOGEL, J. (2009): Die Käferfauna (Coleoptera) der Oberlausitz. Teil 1. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft **12**: 252 S., 1 Karte. Dresden.

KLAUSNITZER, B., HORNIG, U., LORENZ, J., GEBERT, J., HOFFMANN, W., SIEBER, M. & RICHTER, W. (2012): Zur Kenntnis der Käferfauna Sachsens (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte **56** (2): 109-122.

KLAUSNITZER, B., HORNIG, U., BEHNE, L., FRANKE, R., GEBERT, J., HOFFMANN, W., JÄGER, O., MÜLLER, H., RICHTER, W., SIEBER, M. & VOGEL, J. (2018): Die Käferfauna (Coleoptera) der Oberlausitz. Teil 3: Nachträge, Gesamtübersicht und Analyse der Umweltbezüge. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft **23**

KLAUSNITZER, B. & STEGNER, J. (in Vorbereitung): Rote Liste und Artenliste Sachsens Bockkäfer. – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

KÖHLER, F. & KLAUSNITZER, B. [Hrsg.] (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft **4**: 185 S. Dresden.

KÖHLER, F. (2000): Erster Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands". – Entomologische Nachrichten und Berichte **44** (1): 60-84.

KÖHLER, F. (2011): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands" (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) (Coleoptera), Teil 1 und 2. – Entomologische Nachrichten und Berichte **55** (2/3): 109-174, (4): 249-254.

KRAHL, M. (2017): *Trichoferus campestris* (FALDERMANN, 1835) – eine neue Art für die Käferfauna Sachsens (Coleoptera, Cerambycidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **61** (1): 73-74.

KWAST, T. (2016): *Agrilus delphinensis* Abeille de Perrin, 1897, eine neue Prachtkäferart für Sachsen (Coleoptera: Buprestidae). – Sächsische Entomologische Zeitschrift **8** (2014/2015): 193-201.

LAMMERS, K. & APENBORN, R. (2017): Untersuchungen der Carabiden- und Hydradephagenfauna verschiedener Sukzessionsstadien in der Bergbaufolgelandschaft des Tagebaus Nochten/Oberlausitz. – Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz **25**: 9-22.

LANGE, C. F. (1886): Verzeichnis der in der Umgebung Annabergs beobachteten Käfer. – Bericht über den Annaberg-Buchholzer Verein für Naturkunde 1883-1895, 7:76-99.

LIEBSCHER. M. (2016): Wiederfund des Schweine-Dungkäfers *Aphodius* (*Sigorus*) *porcus* (FABRICIUS, 1792) (Coleoptera, Scarabaeidae, Aphodiinae) in Sachsen. – Entomologische Nachrichten und Berichte **60** (2): 152.

LÖBL, I. & LÖBL, D. (Eds.) (2015): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2/1, 2/2. Hydrophiloidea – Staphylinoidea. Revised and Updated Edition. – Brill, Leiden, Boston, XXV + 900, 901-1702 S.

LÖBL, I. & SMETANA, A. (Eds.) (2007, 2008): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 4, 5. – Apollo Books, Stenstrup.
LOMPE, A. (2016): Die Käfer Europas. Mycetophagus. – http://www.coleo-net.de/coleo/texte/mycetophagus.htm [17.04.2016].
LORENZ, J. & BRUNK, I. (2017): 7. Treffen ostsächsischer Koleopterologen im Juni 2016. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen **36** (121): 101-105.
PESCHEL, R. (2017): Erwähnenswerte Käferfunde (Coleoptera) aus Deutschland. – Entomologische Nachrichten und Berichte **61** 3/4: 228-229.
PESCHEL, R. (2018): Neufunde und weitere bemerkenswerte Käfernachweise (Coleoptera) aus Sachsen und Thüringen. – Entomologische Nachrichten und Berichte **62** (1):
REITTER, E. (1916): Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. V. Band. – Stuttgart, 343 S.
RÖßNER, E. (2016): *Melinopterus reyi* (REITTER, 1892) – ältere Nachweise in Sachsen und Sachsen-Anhalt (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae). – Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt **24** (2): 60-62.
SIEBER, M., HOFFMANN, W., RICHTER, W., HORNIG, U. & KLAUSNITZER, B. (2011): Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna Sachsens (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte **55** (1): 63-65.
SLÁMA, M. (2006): Coleoptera: Cerambycidae. – Folia Heyrovskyana, Series **B**, 4: 1-40.
VOGEL, J. (2017): Ergänzungen und Berichtigungen zur Staphylinidenfauna von Sachsen (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte **61** (1): 19-36.
ZEUNER, M. (1994): Die Bockkäferfauna des sächsischen Erzgebirges und Vogtlandes (Col., Cerambycidae). – Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz **17**: 95-156.

Manuskripteingang: 02.02.2018

Anschriften der Verfasser:
Uwe Hornig
Lindenberger Straße 24, D-02736 Oppach

Dr. Jörg Lorenz
Siedlerstraße 22, D-01665 Käbschütztal OT Löthain

Abb. 1: *Cycloderes pilosulus.* Foto O. JÄGER.