674.
Faunistisch interessante Käferfunde aus dem Dresdner Raum (1998/99) (Col.)

Hydroporus longicornis SHARP: je 1 Ex. Mitte Sept. 1998 und Ende Mai 1999 im Waldgebiet Dresdner Heide im sumpfigen Quellbereich eines kleinen Baches; mehrere Ex. 1999 auch in Bodenfallen am Ufer des Moorteiches im NSG „Waldmoore bei Großdittmannsdorf"; nach KLAUSNITZER (1996) bisher nur ca. 20 Jahre zurückliegende Funde aus dem Oberen Erzgebirge sowie eine fragliche Meldung von HORION (1941): „Prießnitz bei Dresden".

Cyphaea curtula (ER.): 1 Ex. Anfang Juni 1999 im Norden der Dresdner Heide (östlich Langebrück) unter feuchter Rinde eines dicken Kronenastes einer umgebrochenen Zitterpappel; offenbar sehr selten; aus Sachsen bisher nur wenige aktuelle Funde aus dem Leipziger Raum bekannt und eine Meldung von 1963 aus Dresden (HORION 1967).

Cerylon deplanatum GYLL.: 1 Ex. Anfang Juni 1999 ebenfalls unter der Rinde dieser Zitterpappel.

Sacium nanum (MULS.): 4 Ex. am gleichen Baum; die etwa 1,5 mm kleine, unauffällige Art soll in ganz Mitteleuropa sehr selten sein; bisher noch keine Funde aus Sachsen bekannt. Die ebenfalls seltene Art *S. pusillum* (GYLL.) wurde Mitte der 90er Jahre mehrfach in Borkenkäfer-Pheromonfallen im Tharandter Wald gefunden (REIKE 1997).

Cryptolestes corticinus (ER.), *C. alternans* (ER.), *Zilora sericea* (STURM), *Abdera triguttata* (GYLL.), *Sphaeriestes castaneus* (PANZ.) mehrfach im Juni 1999 in Gehölzen nördlich von Langebrück von am Boden liegenden Kiefernästen geklopft.

Plegaderus saucius (ER.): 1 Ex. im Juni 1999 im gleichen Gebiet unter Rinde einer relativ frisch abgestorbenen, noch stehenden Kiefer.

Corticeus fasciatus (F.): 1 Ex. Mitte Mai 1999 an rindenlosen, besonnten Stammpartien einer alten Solitär-Eiche im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet zusammen mit *Scymnus ater* (KUG.). Die Lokalität ähnelt in Struktur und Exposition dem Fundort in Dresden (LORENZ 1999).

Phloiotyra rufipes (GYLL.): 1 Ex. Mitte Juni 1999 im (einstweilig sichergestellten) NSG „Waldmoore bei Großdittmannsdorf" unter der Rinde eines am Boden liegenden, stark dimensionierten Birkenstammes.

Menesia bipunctata (ZOUBK.): 3 Ex. Juni 1999 im gleichen Gebiet am besonnten Waldrand auf Faulbaum.

Litargus balteatus LEC.: 2 Ex. im September 1999 in Tharandt an feuchten Dachlatten mit Schimmelpilzbewuchs (aus Amerika eingeschleppt - Ausbreitung offenbar über Holztransporte bzw. Baumärkte); bisherige Nachweise aus Sachsen: zwei Meldungen Mitte der 90er Jahre aus dem Leipziger Raum und aus Ostsachsen (KLAUSNITZER, mündl. Mitt.). Nach Durchsicht meines Sammlungsmaterials fiel mir noch ein Exemplar von *L. balteatus* auf, das ich bereits im Januar 1994 in einer Altbauwohnung in Stolpen fing.

Die Buntkäferart *Opilio pallipes* (OL.) wurde im Juni 1997 im Moritzburger Wald in einem Stammeklektor, der an einer alten, absterbenden Eiche befestigt war, gefunden. Bereits GRÄMER (1968) erwähnt von dieser seltenen Art Funde aus der Umgebung von Meißen (coll. WIESSNER) und aus der Umgebung von Bautzen (coll. SCHMIDT, coll. KOKSCH). Die Meldung von BERNHARD (1999) ist somit kein Erstnachweis für Sachsen.

Für Hinweise zur Ökologie und Verbreitung einiger Arten sowie für die Überprüfung von Belegmaterial danke in Herrn Prof. Dr. B. KLAUSNITZER sowie den Herren D. AHRENS, J. VOGEL und J. ZINKE recht herzlich.

Literatur

BERNHARD, D. (1999): Erstnachweis von *Opilio pallidus* (OL.) (Cleridae) für Sachsen. - Mitt. Sächs. Ent. 46: 19.
GRÄMER, R. (1968): Die Verbreitung der Buntkäfer (Cleridae) in Sachsen. - Ent. Ber.: 115-118.
HORION, A. (1941): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. I: Adephaga-Caraboidea. - Krefeld.
HORION, A. (1967): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. XI: Staphylinidae, 3. Teil (Habrocerinae bis Aleocharinae, ohne Subtribus Athetae). - Überlingen/Bodensee.
KLAUSNITZER, B. (1996): Kommentiertes Verzeichnis der Wassertreter (Haliplidae), Schlammschwimmer (Hygrobiidae), Tauchkäfer (Noteridae), Schwimmkäfer (Dytiscidae), Taumelkäfer (Gyrinidae), Buckelwasserkäfer (Spercheidae), Wasserkäfer im engeren Sinne (Hydrophilidae ohne Sphaeridiinae und Helophorinae) des Freistaates Sachsen. - Mitt. Sächs. Ent. 34: 3-12.
LORENZ, J. (1999): Interessante Käferfunde in Sachsen (1997/98). - Ent. Nachr. Ber. 43/2: 136.
REIKE, H.-P. (1997): Erfassung und Determination sowie ökologische und artenschutzbezogene Wertung von Beifängen aus Borkenkäferpheromonfallen im Tharandter Wald. - Diplomarbeit TU Dresden.

Anschrift des Verfassers:
Dr. J. Lorenz
Talmühlenstr. 4
D-01737 Tharandt